

Регламент применения:

- Дозы внесения коррелируют с учетом плодородия почв в соответствии с рекомендациями территориальных сельскохозяйственных научных организаций, агрохимических центров

Сельскохозяйственная культура	Доза внесения, кг/га	Примечание
<i>Озимые зерновые</i>	120-140	Перед основной обработкой (вспашка)
<i>Картофель столовый</i>	120-200	Осенью при зяблевой вспашке или весной перед весенней перепахкой
<i>Сахарная свекла фабричная</i>	200-300	Осенью перед зяблевой обработкой или весной перед предпосевной обработкой
<i>Кормовая сахарная свекла на корм скоту</i>	200-400	Осенью перед зяблевой обработкой или весной перед предпосевной обработкой
<i>Кукуруза на зеленый корм и силос</i>	240-400	Осенью перед зяблевой обработкой или весной перед предпосевной обработкой
<i>Озимые промежуточные культуры</i>	140-180	Под посевную или предпосевную обработку
<i>Однолетние травы</i>	120-130	Осенью под зябь или весной под предпосевную обработку
<i>Капуста</i>	90-240	Под предпосевную обработку
<i>Морковь</i>	90-120	Под предпосевную обработку
<i>Редис</i>	80-100	Под предпосевную обработку
<i>Томат</i>	60-90	Под предпосевную обработку
<i>Огурцы</i>	60-90	Под предпосевную обработку
<i>Лук, чеснок</i>	70-120	Под предпосевную обработку
<i>Перец</i>	90-120	Под предпосевную обработку
<i>Сельдерей, укроп, салат, шпинат, ревень</i>	60-90	Под предпосевную обработку
<i>Цветоводство</i>	80-140	Под предпосевную обработку
<i>Газоны</i>	150-300	Под предпосевную обработку
<i>Фруктовые, ягодные культуры</i>	150-200	Перед посадкой в посадочные ямы, либо, под растущие растения, смешивая с землей